



BUREAU DES EXAMINATEURS EN OPTOMÉTRIE DU CANADA

*Vous trouverez ci-après un exemple de scénario utilisé pour
l'ECOS du BEOC et publié sur le site Web du BEOC.*

PRÉSENTATION DE CAS

Patient:

Homme âgé de 85 ans

Plainte principale :

Vision embrouillée lorsqu'il regarde la télévision et lorsqu'il conduit.

Antécédents oculaires :

Aucune chirurgie oculaire. Acuité visuelle dans l'OS réduite pour aussi longtemps qu'il puisse se souvenir.

Antécédents médicaux :

Maladie cardiaque et hypertension artérielle contrôlées par plusieurs médicaments

Données cliniques :

Lunettes actuelles : OD : +1.25/-0.75 X 070 Addition : +2.50 6/30, 0.75M

OS : +1.00 Addition : +2.50 6/120, < 1.25M

Tests écran : OS : hypertropie de 15 dioptries prismatiques avec ésoptropie de 10 Δ

Santé oculaire : Sclérose nucléaire et changements lenticulaires corticaux OU

Lacunes de l'épithélium pigmentaire rétinien au niveau maculaire OU

Fins précipités kératiques au niveau de l'endothélium cornéen OU, arcs cornéens OU

PIO : OD : 8 mmHg OS: 10 mmHg à 2:00 p.m.

-
- L'acuité visuelle optimale corrigée est de OD : 6/21 et OS : 6/120 avec OD : +1.75/-1.25 X 060 et OS : +1.50. La gestion initiale la plus appropriée pour ce patient serait**
 - de le référer pour chirurgie de cataracte à l'OD.
 - de le référer pour mesures d'acuité potentielle à l'OS.
 - de le référer pour chirurgie de cataracte à l'OS.
 - de prescrire de nouvelles lunettes pour conduire.
 - Votre patient est d'accord pour subir la chirurgie de cataracte. Pendant les premiers jours suivants la chirurgie, il pourra s'attendre à**
 - être capable de conduire par lui-même.
 - devoir rester au lit.
 - voir le téléviseur plus clairement.
 - ne plus avoir à porter de lunettes.
 - Suite à la chirurgie de cataracte, combien de temps devriez-vous attendre avant de fournir une nouvelle prescription de lunettes?**
 - 1 semaine
 - 3 semaines
 - 6 semaines
 - 3 mois
 - Cinq mois après la chirurgie, le patient revient avec une plainte de vision embrouillée dans son œil opéré lorsqu'il regarde la télévision ou lorsqu'il lit. La cause la plus probable de ses symptômes est**
 - œdème maculaire cystoïde.



BUREAU DES EXAMINATEURS
EN OPTOMÉTRIE DU CANADA

*Vous trouverez ci-après un exemple de scénario utilisé pour
l'ECOS du BEOC et publié sur le site Web du BEOC.*

- B. brouillard de la capsule.
- C. décollement de la rétine.
- D. changement au niveau de la réfraction.

Exemple de scénario — Public